

NATURE DE LA MALADIE. — RENSEIGNEMENTS CLINIQUES.

- ENTERIE PEU GRAVE, devenue chronique ; fièvre le soir, 4 garde-robes. — q. aliments légers : tis. de riz gom. suc ; julep morphiné ; 1/4 lavement amid. *bis*.
- ENTERIE GRAVE, en voie de guérison. — D. q. de vin ; tis. d'orge suc ; de temps en temps, calomel 25 centig.
- ENTERIE INTENSE, chronique ; fièvre le soir ; 5 à 8 garde-robes. — Soupe légère ; tis. de riz gom. suc., ext.-gom. d'opium, 6 centig.
- ENTERIE. Encore un peu de gonflement et de raideur dans les articulations de la main gauche ; plus de fièvre ; — Q. q. tis. d'orge nitrée, 1 gramme ; pansement avec flanelle et huile camphrée laudanisée.
- ENTERIE. Le dernier accès, il y a 6 jours. — D. D. D. Eau gom. suc.
- ENTERIE. Une hémoptisie d'intensité moyenne, il y a 3 mois ; pas de fièvre. — D. q. D. vin, tis. pect., julep simple, huile de foie de morue, 15 grammes, matin et soir.
- ENTERIE. ROSE COMMENÇANTE. — 3/4 D. D. Eau vin. ; pilules aloétiques, 2 (1 gramme) ; pansement à sécher du vésicatoire de la tempe. (A déjà eu 3 applications de vésicatoire avec la pommade de Gondret.)
- ENTERIE. INTERMITTENTE REBELLE. Accès erratiques : le dernier accès, il y a dix jours ; engorgement notable du foie et de la rate. — R. R. R. Eau vineuse ; vin de quinquina, le matin.
- ENTERIE. CHRONIQUE. 5 à 4 garde-robes ; affaiblissement notable. — Q. sp^e. D. v. v. Décoction de quinquina légère ; vin de quinquina, le matin ; opium sero, 5 centigr. ; 1/4 lavement amid.
- ENTERIE. MIE PALUDÉENNE. Engorgement considérable des viscères abdominaux ; un peu d'œdème aux malléoles ; n'a pas eu d'accès, depuis deux mois. — R. R. R. Eau vineuse ; vin de quinquina.
- ENTERIE. CHRONIQUE. 3 rechutes ; la dernière, il y a un mois ; 3 garde-robes. — Q. q. q. de riz, gom. suc. ; julep morphiné sero.
- ENTERIE. — D. q. Tis. orge suc. ; 1/2 lavement amid., laudanisé sero.
- ENTERIE. PERNICIEUSE. Accès pernicieux, forme algide, y il a dix jours. Antérieurement, nombreux accès, D. q. D. Décoction de quinquina ; sulfate de quinine, 50 centigr.
- ENTERIE. FRACTURE CONSOLIDÉE DE LA CUISSE. R. R. R. Tis. d'orge, bandage roulé, compresses résolutes.
- ENTERIE. CHRONIQUE. q. q. D. v. v. Décoc. de quinquina légère. 1/2 lavement au ratanhia.
- ENTERIE. HYPERTROPHIE DU CŒUR. Saignée de 450 grammes, il y a six jours, q. q. Lim. tartrique suc. ; poudre de digitale, 20 centigr., pansement du cautère à la région précordiale.
- ENTERIE. CHRONIQUE. Rechute il y a 8 jours. — q. sp^e. q. v. v. Tis. alb., opium sero, 5 centigr.
- ENTERIE. AMPUTATION DU BRAS. — Il y a encore un point en suppuration à l'angle de la plaie. — R. R. R. Tis. d'orge ; pansement simple, lavement émollient.
- ENTERIE. INTERMITTENTE REBELLE. — R. R. R. Eau vineuse ; vin de quinquina, le matin, solution arsenicale, 50 grammes (arsenic 2 centigr.), une heure après le repas du matin.
- ENTERIE. DIARRHÉES VÉGÉTALES. Deuxième accès, il y a dix jours ; première selle abondante, il y a 5 jours. — D. q. D. Infusion dayapana sucrée ; huile de ricin, 15 grammes le matin.
- ENTERIE. FÈVRE TYPHOÏDE. — q. q. D. v. Aliments légers ; eau vineuse suc. ; vin de Malaga ; 1/2 lavement émollient.
- ENTERIE. — D. D. 3/4 v. infus. de houblon suc. ; huile de foie de morue, 15 grammes, matin et soir. Friction iodurée. cataplasmes, julep morphiné sero.